



PROJETO CARANGUEJO-UÇÁ

A ANDADA DO CARANGUEJO



FUNCEP
Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza



APAMAR



esquerda

esquerda

direita

direita



zoéa



zoéa



zoéa



zoéa



zoéa




megalopa



megalopa



megalopa



megalopa



megalopa



caranguejo



caranguejo



caranguejo



caranguejo



caranguejo



No mar, os maiores perigos que a larva de caranguejo enfrentam são:

- a. As redes de pesca.
- b. As baleias assassinas.
- c. Os predadores naturais.
- d. A hélice dos barcos.

1

Quantos ovos aproximadamente uma fêmea de caranguejo-uçá desova a cada vez?

- a. Um tantinho só.
- b. 1.000 ovos.
- c. 10.000 ovos.
- d. 100 mil ovos.

1

De cada 100.000 larvas zoéas que nascem na natureza, quantas chegarão à idade adulta aproximadamente?

- a. 1.
- b. 100.
- c. 1.000.
- d. Um montão deles.

3

Quais dessas são as fases de larva do caranguejo-uçá?

- a. Alevino I e alevino II.
- b. Zoeira e megafone.
- c. Zoéa e megalopa.
- d. Náuplio e misis.

1

Quem é o maior predador de caranguejos adultos?

- a. O guaxinim que vive no manguezal.
- b. As aves, especialmente a garça.
- c. O homem, que captura em excesso.
- d. Os peixes, especialmente o robalo.

2

O que causa a doença que está matando milhares de caranguejos no nordeste do Brasil e que recebeu o nome de Doença do Caranguejo Letárgico?

- a. Um mosquito.
- b. O homem.
- c. O vírus da gripe.
- d. Um fungo.

1

Como é o nome do período em que não se pode capturar o caranguejo?

- a. Ataque.
- b. Defeso.
- c. De tarde.
- d. De noite.

2

Qual é a diferença entre machos e fêmeas de caranguejos?

- a. Fêmeas são peludas e os machos não têm pelos.
- b. Machos são vermelhos e as fêmeas mais azuladas.
- c. O abdômen do macho é pequeno e da fêmea é grande e arredondado.
- d. Os machos usam calção e as fêmeas usam biquíni.

3



Porque todo manguezal cheira ovo podre?

- a. Porque a maior parte da matéria orgânica que desce os rios acaba ficando presa no manguezal, onde apodrece.
- b. Porque os criadores de frango costumam jogar os ovos que apodrecem nestes locais.
- c. Porque tem muito oxigênio na lama do manguezal.
- d. Por absoluta falta de desodorante.

2

Do que as larvas do caranguejo se alimentam quando estão vivendo no mar?

- a. De hambúrguer de siri.
- b. De folhas de mangue.
- c. De pequenas algas e de animais microscópicos que encontra na água.
- d. De peixes.

3

O caranguejo adulto se alimenta do que no manguezal?

- a. Só de folhas de mangue frescas e bem verdinhas.
- b. De hambúrguer de peixe.
- c. De peixes que entram em sua toca na maré cheia.
- d. De folhas de mangue amareladas e peixes mortos.

4

Por que as larvas de caranguejo vão para o mar depois que nascem?

- a. Para escapar dos predadores que vivem na lama dos manguezais.
- b. Porque elas gostam muito de aventura e precisam dessa adrenalina para viver.
- c. Para escapar dos catadores de caranguejo.
- d. Porque tem mais alimento e a temperatura não varia tanto.

4

Por que as larvas do caranguejo-jo-uçá só nascem em noites de lua cheia ou lua nova?

- a. Porque a luz da lua facilita para as larvas acharem o caminho para o mar.
- b. Porque as marés são mais fortes e levam as larvas pra mais longe na costa.
- c. Porque elas são românticas.
- d. Porque chove muito nessa época e os rios quando enchem carregam as larvas para o mar.

3

As fêmeas de caranguejo:

- a. Carregam os seus ovos presos no seu abdômen até o nascimento das larvas.
- b. Liberam seus ovos na água do mar e eles são levados pelas correntes marinhas.
- c. Liberam caranguejinhos á prontos para cavar suas toquinhas no manguezal.
- d. Liberam as larvas sobre as folhas que flutuam na água e depois são levadas para o mar, para o desespere de suas mães.

1

Quanto tempo demora para um caranguejo para crescer e chegar ao tamanho comercial?

- a. Um piscar de olhos.
- b. Seis meses.
- c. Um ano.
- d. Cinco anos.

2

O catador consciente só captura caranguejos...

- a. ...que caibam na panela.
- b. ...durante a época da andada (carnaval dos caranguejos).
- c. ...machos com mais de 6 cm e fêmeas, somente as não ovadas.
- d. ...machos com mais de 6 cm.

4